

LART: Données de 2011

A. baumannii

N=1126

Répartition des souches d'*A. baumannii* selon les centres

Centre	Nombre de souches	Souches résistantes à l'imipénème Nb (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	224	152 (67,8)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	122	75 (61,4)
Hôpital d'enfants de Tunis	55	28 (50,9)
Hôpital la Rabta	304	213 (70)
Hôpital Militaire de Tunis	178	141 (79,2)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	33	18 (54,5)
Centre de greffe de moelle osseuse	5	4 (80)
Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	205	154 (75,1)
Total	1126	785 (69,7)

Distribution des souches de *A. baumannii* selon le type de prélèvement (N=1126)

	Nombre	%
Urines	181	16
Prélèvements pulmonaires	433	38
Ponctions	22	2
Hémocultures	202	18
Pus	162	14
Autres*	126	11

* Matériel

Distribution des souches de *A. baumannii* selon les services (N=1126)

	Nombre	%
Chirurgie	221	20
Médecine	99	9
Gynécologie	19	2
Néonatalogie	50	4
Pédiatrie	67	6
Ambulatoire	56	5
Réanimation	602	53
Onco-hématologie	12	1

Taux de résistance aux antibiotiques de *A. baumannii*

	Total N=1086		Hémocultures N=187		Prélèvements Pulmonaires N=423	
	R	R+I	R	R+I	R	R+I
Ticarcilline	79	84.4	72.4	76.5	93	94.5
Ticarcilline + Clavulanique	75.8	80.1	67.7	71.5	92	93
Ceftazidime	80.6	87.2	74.4	75	91	91
imipénème	51	60.7	57.2	63.2	72	83
Gentamicine	61	66.6	50	64.2	71	80
Tobramycine	53.5	57.5	41	46.7	61	64.5
Amikacine	66	68.4	52.5	53	84	87
Ciprofloxacine	80.4	80.4	75	75	93	93
Colistine	0	0	0	0	0	0

Taux de résistance des *A. baumannii* résistantes à l' imipénème aux autres antibiotiques (N=755)

Antibiotiques	Pourcentages	
	R	R+I
Ticarcilline	100	100
Ticarcilline + Clavulanique	100	100
Gentamicine	71	78
Tobramycine	60	66
Amikacine	75	80
Ciprofloxacine	97	97
Colistine	0	0

Prévalence des souches de *A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les services

	Nombre total (N=1126)	Nombre de souches résistantes à l'imipénème (N=785)	%
Chirurgie	221	143	65
Médecine	99	40	40
Gynécologie	19	4	21
Néonatalogie	50	37	74
Pédiatrie	67	33	49
Ambulatoire	56	22	39
Réanimation	602	500	83
Onco-hématologie	12	6	50

Prévalence des souches de *A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les prélèvements

	Nombre total de souches (N=1126)	Nombre de souches résistantes à l'imipénème (N=785)	%
Urines	181	94	52
Prélèvements pulmonaires	433	352	81
Ponctions	22	12	55
Hémocultures	202	145	72
Pus	162	93	57
Autres*	126	89	71

* Matériel