

LART: Données de 2011

Enterococcus faecalis

N=839

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	222
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	143
Hôpital d'enfants de Tunis	36
Hôpital la Rabta	116
Hôpital Militaire de Tunis	166
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	19
Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	133
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	4
Total	839

Distribution des souches de *E. faecalis* selon les prélèvements (N=839)

	Nombre	%
Urines	544	64,5
Pus	118	14
Hémocultures	89	10,5
Prélèvements pulmonaires	6	1
Ponctions	6	1
ORL	8	1
Autres	68	8

Distribution des souches de *E. faecalis* selon le service (N=837)

	Nombre	%
Chirurgie*	279	33
Réanimation	77	9
Médecine	140	17
Pédiatrie	100	12
Gynécologie	23	3
Néonatalogie	47	6
Onco-hématologie	20	2
Ambulatoire	151	18

*service d'urologie occupe la 1ère place

Taux de résistance aux antibiotiques de *E. faecalis*

	Total		urines		Hémocultures	
Nombre	835		544		89	
	%R	%R+I	%R	%R+I	%R	%R+I
Amoxicilline	0,6	2	0,7	2	0	4,5
Streptomycine (haut niveau)	32,2	37,1	35,2	40	25,8	28
Gentamicine (haut niveau)	21,3	22,8	23,9	27,2	18	20,2
Erythromycine	61,8	76,1	65,6	79,9	57,3	83,1
Rifampicine	8,1	17,6	6,2	15	11,2	22,4
Vancomycine	0,7	0,9	0,4	0,9	4,5	4,5