

LART: Données de 2012

Salmonella
(N=197)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches	Nombre de souches résistantes aux C3G
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	52	0
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	17	0
Hôpital d'enfants de Tunis	31	1
Hôpital la Rabta	27	0
Hôpital Militaire de Tunis	16	0
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	0	0
Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	40	0
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	3	1
Total	174	2

Distribution des souches de *Salmonella* selon le prélèvement (N=197)

Prélèvement	Nombre	%
Selles	67	34
Hémocultures	67	34
Urines	31	15,7
Abcès/pus	28	14,2
Ponctions	4	2

Distribution des souches de *Salmonella* selon les services (N=196)

Services	Nombre	%
Médecine	76	38,7
Pédiatrie	50	25,5
Chirurgie	31	15,8
Ambulatoire	39	19,9

Distribution des souches de *Salmonella* selon le sérotype (N=192)

	Nombre	%
S. Typhi	1	0,5
S. Enteritidis	70	36,4
S. Typhmirium	45	23,4
S. Kentuncky	13	6,7
Salmonella Lindenburg	1	0,5
S. Livingstone	2	1
<i>Salmonella</i> spp.	35	18,2
Autres	25	13

Taux de résistance aux antibiotiques de *Salmonella spp* (N=174)

Antibiotiques	%R	%R+I
Amoxicilline	29,8	31,4
Amoxicilline – Acide clavulanique	7,3	18,8
Céfaltine	2,6	14,3
Céfoxitine	0,5	0,5
Cefotaxime / Ceftazidime	0,5	1
Imipénème	0	0
Gentamicine	2,6	3,6
Amikacine	0,5	1
Quinolones	44	50
Cotrimoxazole	16,5	16,5
Chloramphénicol	3,1	3,7
Tétracycline	25,1	27,7

NB: La souche de *Salmonella* Typhi était sensible à tous les antibiotiques testés