

LART: Données de 2014

A. baumannii

N=911

Répartition des souches d'*A.baumannii* selon les centres

Centre	Nombre de souches	Nombre de souches résistantes à l'imipénème
Hôpital Habib Bourguiba de Sfax	270	231
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	139	93
Hôpital d'enfants de Tunis	74	46
Hôpital la Rabta	253	180
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	15	11
Centre de greffe de moelle osseuse	7	6
Hopital Abderrahmen Mami Ariana	150	123
Hôpital Aziza Othmana	3	0
Total	911	690

Distribution des souches de *A. baumannii* selon le prélèvement

Prélèvement	Nombre	%
Urines	148	15.8
Prélèvements pulmonaires	420	44.8
Ponctions	23	2.5
Hémocultures	137	14.6
Pus	109	11.6
Autres*	101	10.6
Total	938	100

Autres *: matériel

Distribution des souches de *A. baumannii* selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	164	19,4
Médecine	83	9,8
Gynécologie	7	0,8
Néonatalogie	61	7,2
Pédiatrie	7	0,8
Ambulatoire	47	5,6
Réanimation	465	55
Onco-hématologie	14	1,7
Total	846	100

Taux de résistance aux antibiotiques d' *A. baumannii*

	Total N= 911			Hémocultures N=137			Pulmonaire N=420		
	nombre	%R	% R+I	nombre	%R	%R+I	nombre	%R	%R+I
Ticarcilline	876	84.7	86.5	126	89.9	90.7	390	89.0	90.7
Pipéracilline	830	82.8	85.5	120	89.2	91.6	384	87.8	89.5
Pipéracilline+ Tazobactam	685	79.1	83.9	96	78.1	88.5	303	87.5	89.7
Céftazidime	805	81.9	86.3	118	84.7	90.6	381	86.6	89.5
Céfépime	726	84.3	88.8	99	96.3	98.1	349	89.4	92.2
Imipénème	880	74.9	79.9	132	66.7	78.7	405	83.5	86.9
Gentamicine	902	75.3	75.3	133	78.2	78.2	410	79.8	79.8
Tobramycine	832	68.5	68.5	122	73.0	72.9	385	73.8	73.8
Amikacine	868	67.3	68.9	128	73.4	75.0	393	73.5	75.0
Ciprofloxacine	806	86.0	86.0	106	84.0	83.9	386	90.7	90.7
Rifampicine	466	16.5	29.0	65	12.3	35.3	249	14.9	25.3

Souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipénème

Antibiotiques	R		R+I	
	N	%	N	%
Ticarcilline	525	96,5	526	96,7
Pipéracilline	484	94,3	496	96,7
Pipéracilline+Tazobactam	336	71,7	431	95,8
Céftazidime	504	93,2	512	94,6
Céfepime	467	96,5	472	97,5
Gentamicine	487	86,2	487	86,2
Tobramycine	430	77,9	430	77,9
Amikacine	429	77,7	437	79,2
Ciprofloxacine	524	96,1	524	96,1
Rifampicine	46	15,9	79	27,3

Prévalence des souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	133	18,5
Médecine	50	6,9
Néonatalogie	29	4,05
Pédiatrie	76	10,6
Ambulatoire	21	2,9
Réanimation	398	55,5
Onco-hématologie	10	1,3
Total	716	100

Prévalence des souches de *A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les prélèvements

Prélèvement	Nombre	%
Urines	94	13,1
Prélèvements pulmonaires	349	48,8
Ponctions	12	1,6
Hémocultures	105	14,6
Pus	87	12,1
Autres*	68	9,5
Total	715	100

Autres*: matériel