

LART: Données de 2011

Salmonella

N=131

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches	Souches résistantes aux C3G Nb (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	31	0 (0)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	15	0 (0)
Hôpital d'enfants de Tunis	37	2 (5,4)
Hôpital la Rabta	28	1 (3,5)
Hôpital Militaire de Tunis	7	1 (14,2)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	0	0 (0)
Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	7	0 (0)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	6	1 (16,6)
Total	131	5 (3,8)

Distribution des souches de *Salmonella* selon le prélèvement (N=131)

	Nombre	%
Selles	62	47,3
Hémocultures	40	30,5
Urine	9	6,9
Abcès/pus	14	10,7
Ponction	5	3,8
Autres	1	0,8

Distribution des souches de *Salmonella* selon les services (N=131)

	Nombre	%
Médecine	59	45,0
Pédiatrie	53	40,5
Chirurgie	11	8,4
Ambulatoire	8	6,1

Distribution des souches de *Salmonella* selon le sérotype (N=131)

	Nombre	%
S. Typhi	2	1,5
S. Enteritidis	62	47,3
S. Typhmrium	18	13,7
S. Kentuncky	6	4,6
S. Mbandaka	2	1,5
S. Newport	5	3,8
S. Livingstone	1	0,8
<i>Salmonella</i> spp.	20	15,3
Autres*	15	11,5

*: Virchow; Montevideo; Newport; Agora; Anatum; Richmond; Eastbourne, Brandenburg, Infantis

Taux de résistance aux antibiotiques de *Salmonella spp* (N=126)

Antibiotiques	%R	%R+I
Amoxicilline	15	34,9
Amoxicilline – Acide clavulanique	8,7	17,5
Céfaltine	4,8	15,1
Céfoxitine	0,9	0,9
Cefotaxime / Ceftazidime	4	4
Imipénème	0	0
Gentamicine	2,4	2,4
Amikacine	4,8	4,8
Quinolones	41	41,1
Cotrimoxazole	7,1	7,1
Chloramphénicol	6,2	7,0
Tétracycline	15	20,2