

LART : Données de 2014

Enterococcus faecalis
(N=604)

Répartition des souches selon les centres

Centres Hospitalo-Universitaires (CHU)	Nombre de souches
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	241
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	180
Hôpital d'enfants de Tunis	34
Hôpital la Rabta	108
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	29
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	4
Hôpital Aziza Othmana	8
Total	604

Distribution des souches de *E. faecalis* selon les prélèvements (N=602)

	Nombre	%
Urines	437	72,59
Prélèvements pulmonaires	0	0
Ponctions	9	1,49
Hémocultures	58	9,64
Pus	62	10,29
Autres*	36	5,99

*Cathéters, épanchements intra-abdominaux, prélèvements périnataux, sondes, prélèvements auriculaires, prélèvement ostéo-articulaire

Distribution des souches de *E. faecalis* selon le service (N=605)

	Nombre	%
Chirurgie	196	32,4
Médecine	144	23,8
Gynécologie	27	4,5
Néonatalogie	23	3,8
Pédiatrie	72	11,9
Ambulatoire	83	13,7
Réanimation	48	7,9
Onco-hématologie	12	2

Taux de résistance aux antibiotiques de *E. faecalis*

	Total			Urines			Hémocultures		
Nombre de souches	604			437			58		
	Nb	%R	%R+I	Nb	%R	%R+I	Nb	%R	%R+I
Amoxicilline	592	0	0	421	0	0	58	0	0
Streptomycine (haut niveau)	503	44,1	44,9	350	46,9	47,4	55	34,5	34,5
Gentamicine (haut niveau)	495	30,1	30,1	346	34,4	34,4	51	27,5	27,5
Erythromycine	587	60,8	71,2	426	59,9	70,4	55	63,6	74,5
Rifampicine	586	4,8	9,4	426	5,4	9,6	57	3,5	8,7
Vancomycine	602	0	0	434	0	0	58	0	0

Évolution du taux global de résistance de haut niveau à la gentamicine (2000-2014)

